

Hygieneplan für Altenheime



WAS? Zielgruppe Objekt	WANN? Zeitpunkt Rhythmus	WOMIT? Arbeitsmittel (z.B. Desinfektionsmittel)	WIE? Anwendung	WER? Verantwortliche oder betreffende Person
Hygienische Hände- desinfektion	Vor und nach dem Patientenkontakt, nach Kontakt mit Blut und kontaminiertem Material, vor Blutabnahmen, bei Verbandwechsel etc.	SEPTOMED Hygienische Desinfektion Konz.- 30 Sek. Noroviren Einwirkzeit 5 Min.	In trockene Hände einreiben bis zur vollständigen Aufrocknung. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalz zu beachten. Merke: Kein Wasser zugeben. Einwirkzeit beachten!	Arzt, Personal
Hände- Hautreinigung	Bei Kontamination nach Bedarf	SENSO SAN Waschlotion	Auf Haut aufbringen intensiv reinigen und abspülen.	Arzt, Personal
Hände- Hautreinigung	Bei Kontamination nach Bedarf	LOTIO SEPT SOFT MRSA-wirksame Waschlotion	Auf die Haut aufbringen, intensiv reinigen und nach 30 Sek. abspülen.	Arzt, Personal
Hände- Hautpflege	Bei Bedarf mehrmals täglich	SENSO SAN Hautpflegelotion	In die Hände / Haut einmassieren.	Arzt, Personal
Hautdesinfektion	Vor allen Injektionen, Blutabnahmen etc.	OP-DERM Hautdesinfektion <u>Talgdrüsenarme Haut:</u> Vor Punctionen von Gelenken Körperhöhlen und Hohlorganen sowie operativen Eingriffen konz. mind. 1 Min. <u>Talgdrüsenreiche Haut:</u> konz. mind. 10 Min., Haut ständig feucht halten.	konz. nach DGHM Klassifiz. Desinfektionsmittel auf die Haut satt aufsprühen oder einreiben und für die vorgeschriebene Einwirkzeit (siehe Etikett) einwirken lassen.	Arzt, Personal
Allgemeine und chirurgische Instrumente	Sofort nach Gebrauch	INSTRU STAR Instrumentendesinfektion und Reinigung aldehyd-und phenolfrei 2 % - 60 min. 3 % - 30 min. 4 % - 15 min.	Instrumente einlegen. Sämtliche Hohlräume und Oberflächen müssen bedeckt bzw. befüllt sein. Entnehmen nach der entsprechenden Einwirkzeit. Abspülen unter fließendem Wasser und trocknen.	Beauftragte
für med. Inventar und Medizin- produkte besonders auch für Acrylglasflächen, Sonnenbänke etc.	Sofort nach Gebrauch Sprühdesinfektion	ACRYZID GF Gebrauchsfertige alkohol- freie Schnelldesinfektion <u>Einwirkzeit:</u> konzentriert nach 1 min.	Unverdünnt bis zur vollständigen Benetzung aufsprühen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen.	Beauftragte
Fußböden im Behandlungszim- mer Flächen aller Art Toilette WC-Bereiche WC-Brillen	Nach Dienstschluss und bei Bedarf	BETA GUARD Flächendesinfektion und Reinigung <u>Bakterizid, fungizid</u> 0,5 % - 4 Std. 1% -60min. / 2% -60min. <u>Tuberkulozid (M.terrae)</u> 3 % - 15 min. <u>HBV / HIV</u> 1% -30min. / 3% -5min.	Mit Desinfektionsmittellösung wischen. Abtrocknen lassen. Bei Bedarf zusätzlich nachwischen. Auch zum Tauchen von Gegenständen geeignet.	Personal Reinigungspersonal
Untersuchungs- tische, Geräte, Behandlungsstuhl im Bereich der Liegeflächen	Nach Kontamination und Arbeitstätigkeit	SPRAY OFF N Sprühdesinfektion für med. Produkte wirksam in 30 sec.	Lösung bis zur vollständigen Benetzung aufsprühen. Trocknen lassen und bei Bedarf zusätzlich nachwischen.
Abfallbeutel	nach Bedarf	ABFALLBEUTEL gekennzeichnete Behälter (Abfall) speziell für verletzungs- gefährdendes Material (Kanülen, Skalpelle etc.)	Sammeln. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden.	Personal

